

Biodiversité de la savane

Réserve de Lésio-Louna-Léfini



La **savane herbeuse** en Afrique s'étend sur **5 millions de kilomètres carrés**. Près de la **moitié** du continent est d'ailleurs couvert par des savanes. Il s'agit d'une **prairie tropicale de hautes herbes**, plus ou moins parsemée d'arbres, avec des températures relativement chaudes toute l'année et des **précipitations saisonnières**.

Cet écosystème unique au monde est riche d'une biodiversité que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Il accueille un grand nombre d'espèces d'animaux, et notamment de **mammifères brouteurs**, en raison des **grandes quantités d'herbe** disponibles. La savane est également importante pour l'homme puisque ses vastes prairies lui permettent de pratiquer **l'élevage**.

De nos jours, les **activités humaines** additionnées aux **changements climatiques** menacent cet écosystème. Les savanes sont régulièrement sujettes à des **incendies**, principalement lors de la saison sèche. L'élevage et l'agriculture quant à eux provoquent une **diminution de l'habitat** des espèces sauvages et donc un **manque de nourriture** à disposition.

3 espèces courantes ...

Le buffle d'Afrique



Le buffle de forêt africain, également connu sous le nom de buffle nain ou buffle du Congo, est **la plus petite sous-espèce de buffle africain**. Malgré son nom, on le trouve couramment dans les **savanes herbeuses**, sa **zone de pâturage** privilégiée. Il y trouve les herbes et autres plantes qui composent son régime alimentaire. Il aime également s'immerger dans les marais pour lutter contre la chaleur et les insectes.

Le buffle d'Afrique vit en **troupeaux** relativement petits de **3 à 30 individus**. Un troupeau typique se compose d'un ou parfois de deux taureaux et d'un harem de vaches femelles, de juvéniles et de veaux. À l'état sauvage, **peu d'animaux prédatent le buffle**. Le léopard d'Afrique est le plus commun. Il s'attaque généralement aux jeunes individus qui s'éloignent trop du groupe. Le crocodile du Nil est le seul prédateur capable de tuer un individu adulte.

À l'origine, classé comme « **préoccupation mineure** » par l'**UICN**, depuis 2019 le buffle d'Afrique est répertorié comme espèce « **quasi menacée** ». Les populations diminuent principalement en raison de la **déforestation** et

de la **chasse pour le commerce de viande de brousse**. Au Congo, la majeure partie de la population nationale se trouve dans les parcs nationaux, lui assurant ainsi une bonne surveillance.

Le guépier nain

Le guépier nain est un oiseau présent dans **l'ensemble de l'Afrique subsaharienne**, à l'exception des forêts denses qui bordent l'équateur et de l'ouest de l'Afrique australe. On le trouve donc en grand nombre ici au Congo.

C'est un oiseau au **plumage très coloré** et au chant doux et paisible. Il fréquente les endroits herbeux, proches d'un point d'eau et affectionne particulièrement la **savane arborée** lors de la saison humide. Il se nourrit d'une grande variété de **petits insectes volants**, et particulièrement d'abeilles, de guêpes et de frelons, d'où son nom.

Cet oiseau niche en solitaire dans des petits terriers sur les escarpements rocheux recouverts d'herbe, les fossés, les sillons et même directement au sol, à l'abri d'une touffe d'herbe. Pendant la nidification il devient **monogame**. Le couple s'isole jusqu'à l'éclosion des œufs. Il rejoint ensuite le groupe chaque nuit pour former un « dortoir ». Les petits guépiers se blottissent les uns contre les autres, les jeunes au milieu, tous dans le même sens pour prévenir d'un éventuel danger.

Le guépier nain **n'est globalement pas menacé**. On estime entre **60 et 80 millions** le nombre d'individus à l'heure actuelle. Insectivore, la première menace réside dans les **insecticides** et autres produits nocifs utilisés pour la culture qui diminuent drastiquement les ressources alimentaires des oiseaux.



Le bongo



Le bongo est **l'une des plus grandes antilopes d'Afrique**, mais également la plus **colorée**. Au Congo on le trouve principalement au **nord**, dans les parcs nationaux d'Odzala Kokoua et de Nouabale-Ndoki à **l'interface entre les forêts et la savane**.

Le bongo a une **alimentation variée** à base d'herbe, de feuilles, d'arbustes, d'écorces, de racines et de fruits. Son imposante taille lui demande une **grande quantité** de nourriture l'obligeant à se déplacer dans les zones où l'herbe et les arbustes bas sont abondants. Il a également besoin de sel dans son alimentation, il est donc courant de le croiser la nuit dans les bains naturels de sel et de minéraux.

Le bongo de l'ouest, également appelé bongo des basses terres, fait face depuis plusieurs années au **déclin de sa population**. Cette sous-espèce est aujourd'hui considérée comme « **quasiment menacée** » sur par l'**UICN**. Outre les prédateurs naturels qui attaquent principalement les jeunes bongos (gros serpents, léopards, hyènes), l'espèce est soumise à **diverses pressions humaines**. La chasse à grande échelle l'a complètement éliminé de certaines zones tandis que leur habitat tend à disparaître au profit de l'agriculture et de l'élevage.